

Collyre HYLO-COMOD® 10 ml

L'unique collyre en flacon multidose contenant de l'acide
hyaluronique sans agent conservateur!



MEDICONSULT



Collyre HYLO-COMOD® 10 ml

Toujours plus de personnes souffrent de sécheresse, de brûlures, de démangeaisons ou d'une sensation de corps étranger dans les yeux. Quelle en est l'origine? Principalement les climatisations, le vent, le froid, les rayons de soleil excessivement forts, un air vicié, la fumée du tabac. Ces troubles peuvent aussi venir d'une grande concentration visuelle telle que la lecture prolongée d'un écran d'ordinateur, la télévision ou la conduite d'un véhicule de nuit. Le risque de souffrir est particulièrement augmenté par le port de verres de contact.

HYLO-COMOD® soulage les symptômes et donne immédiatement un sentiment de confort en formant sur l'œil un film protecteur de longue durée, sans pour autant diminuer la vision. Les verres de contact glissent sans friction et plaquent parfaitement à la cornée, évitant ainsi une fatigue «mécanique» de l'œil.

Le collyre HYLO-COMOD® est stérile et sans agent conservateur. Il contient une substance propre au corps humain qui a la propriété d'humidifier et d'adoucir la surface de l'œil. C'est pourquoi on peut utiliser l'HYLO-COMOD® sans problème aussi souvent et longtemps que nécessaire. Ceci s'adresse, bien entendu, aussi aux porteurs de verres de contact.

Posologie (fréquence et durée)

HYLO-COMOD® devrait être dosé d'une manière individuelle en fonction de la sensibilité de l'utilisateur et des recommandations de l'ophtalmologue. En règle générale on instille trois fois par jour une goutte d'HYLO-COMOD® dans le sac conjonctival, pour chaque œil. En cas de troubles plus prononcés on peut sans hésitation appliquer HYLO-COMOD® plus souvent.

Contre-indications

HYLO-COMOD® ne devrait pas être utilisé en cas d'hypersensibilité à l'un des constituants.

Interaction avec d'autres médicaments

HYLO-COMOD® ne devrait pas être utilisé en même temps que d'autres médicaments pour les yeux. Si d'autres collyres devaient aussi être appliqués, il faudrait attendre au moins 30 minutes entre l'instillation de chacun. Les pommades ophtalmiques devraient sans exception être appliquées dans le sac conjonctival après le collyre HYLO-COMOD®.

Conservation

Ne pas conserver au-dessus de 25°C. Une fois le flacon entamé, le collyre est utilisable pendant 12 semaines. Passé la date de péremption le collyre HYLO-COMOD® ne doit plus être utilisé. Entreposer hors de portée des enfants.

Présentation

Collyre en flacon de 10 ml

Composition

1 ml de solution contient 1mg d'acide hyaluronique, du sel de sodium, de l'hydrogénophosphate de sodium x 2 H₂O, du mono hydrogénophosphate de sodium x 12 H₂O, du sorbitol (D-glucitol) et de l'eau pour préparations injectables.

Quelques avantages du collyre HYLO-COMOD®

- Se fluidifie grâce au mouvement des paupières
- Utilisable avec tous les types de verres de contact
- Apaise en cas de sécheresse oculaire
- Contient une substance propre au corps humain
- Durée de conservation exceptionnelle de 12 semaines après ouverture du flacon
- Dosage précis jusqu'à la dernière goutte
- Economique et écologique
- Sans agent conservateur
- Conditionné dans un emballage testé et éprouvé, le système COMOD™

Distribution en Suisse: MEDICONSULT SA

